

山形県吸入指導プロセスフロー

病院

【初回】

患者に対し吸入連携について説明と同意確認
吸入指導依頼票(医師欄)を記入、院外処方箋を発行
吸入指導依頼票および院外処方箋の提出

保険薬局

吸入指導を行い吸入指導依頼票(薬剤師欄)を記入

吸入指導依頼票をFAX返信(情報のフィードバック)

病院

返信された吸入指導依頼票をカルテに反映させる

保険薬局

【2回目以降】

継続指導と情報のフィードバック

- ① 医師は吸入指導初回の患者に対し、吸入連携(病院と保険薬局の共有化と吸入治療のサポート)の説明と同意確認を行います。(※2回目以降の指導に関しては初回にて同意済みの箇所にレ点チェックを入れて下さい)
- ② 医師は吸入指導依頼票(医師欄)に必要事項を記入し、院外処方箋と共に患者に渡す。
- ③ 患者は依頼票および院外処方箋を保険薬局へ提出します。
- ④ 保険薬局の薬剤師は依頼票の内容を確認し、【標準手順書】【医師・薬剤師の吸入指導の流れ】をもとに吸入指導を行い、依頼票を(薬剤師欄)記入します。評価は◎(できる)、○(確認が必要)、△(できない)の3段階で評価し、継続指導の必要性の有無にレ点を入れて下さい。(薬剤師より医師へ)の欄は吸入指導についての相談等を記入して下さい。(患者さんの訴え・その他特記事項)の欄は特記事項を記入して下さい。
- ⑤ 保険薬局の薬剤師は依頼票を依頼元の病院にFAX送信します。FAX番号は各病院で設定し、依頼票に記載された番号として下さい。保険薬局はFAX送信後、必要に応じ病院にFAX受信確認をして下さい。
- ⑥ 病院は、各施設のシステムに従って依頼票を保存し、評価内容を次回診察時に医師が確認できるようにします。依頼票の記載に不明な点がある場合は、保険薬局に確認して下さい。症状のコントロールが良好な場合でも定期的に吸入指導を行い、手技や理解度の確認を行うことを推奨します。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

やまがた医療連携吸入指導依頼票 お問い合わせ窓口 金井 (TEL:090-8784-6782)

医師・薬剤師の吸入指導の流れ

下記に示す一連の指導を行うことにより「服薬情報等提供料(15点)」を算定することができます。医師からの同意取得の際に算定についての情報提供がなされていますが、再度ご説明のうえ同意をいただき算定を行ってください。

1. 医師は患者情報を記入 (①)
2. 医師は患者に対し、吸入連携の説明と同意確認を行う (②)
3. 薬剤師は患者に対し、手技評価の項目に沿って吸入手技を確認し、依頼票に記入 (③) また、継続指導の必要性を記入 (④)
4. 依頼票に評価・医師へのコメントを記入 (⑤⑥)
5. 依頼票を依頼施設にFAX送信 (情報のフィードバック)

やまがた医療連携吸入指導依頼票

() 診療所/病院 () 医師 FAX: TEL:

住所: 患者氏名 ① 様 「喘息」 「COPD」 「その他 ()」

コントロール状況 「良好」 「不十分」 「不良」

以下の指導を重点的にお願いします 「吸入指導」 「継続の必要性」 「薬効説明」

③手技の評価の記入
◎できる
○確認が必要
△できない

手順	薬剤		②でできる・○確認	
	新規	継続	新規	継続
① 薬剤の準備	◎	○	△	△
② 息吐き	◎	○	△	△
③ 吸入	◎	○	△	△
④ 息止め	◎	○	△	△
⑤ 息吐き	◎	○	△	△
⑥ 後片付け	◎			
⑦ うがい	◎			
継続指導の必要性				
薬剤師より医師へ				
医師より薬剤師へ				

④手技評価に1つでも○または△がついた場合には「継続指導の必要性」有とする

⑤ (例)
・同調吸入が難しい為、スパーサーの使用を開始した
・吸入手技・吸気流速に問題ありなど

⑥次回確認が必要な点、指導において不安が残った点など


ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さい。

やまがた医療連携吸入指導依頼票 お問い合わせ窓口 金井 (TEL:090-8784-6782)

吸入指導手順書について

群馬県薬剤師会ホームページの吸入手順書を活用
<http://www.gunyaku.or.jp/public/kyuunyuu/index.html>

薬剤師用	患者用
ディスカス薬剤師用	ディスカス患者用
レスピマット薬剤師用 RENEW	レスピマット患者用 RENEW
ツイストヘラー薬剤師用	ツイストヘラー患者用
タービュヘイラー薬剤師用	タービュヘイラー患者用
クリックヘラー薬剤師用	クリックヘラー患者用
ロタディスク薬剤師用	ロタディスク患者用
ハンディヘラー薬剤師用	ハンディヘラー患者用
エアゾール薬剤師用	エアゾール患者用
エアゾール+スプレー薬剤師用	エアゾール+スプレー患者用
ブリーズヘラー薬剤師用	ブリーズヘラー患者用
エリプタ薬剤師用	エリプタ患者用
スイングヘラー薬剤師用	スイングヘラー患者用
ジェヌエア薬剤師用	ジェヌエア患者用



①薬剤の準備、②息吐き、③吸入、④息止め、⑤息吐き、⑥後片付け、⑦うがい の7段階にて吸入指導を実施。